

ORIENTAÇÕES PARA O EXAME DE ENDOSCOPIA

JEJUM ABSOLUTO A PARTIR DA 23 HORAS DO DIA ANTERIOR

EM GERAL, AS MEDICAÇÕES DE USO CONTÍNUO NÃO DEVEM SER INTERROMPIDAS.
(ANTIHIPERTENSIVOS, ANALGÉSICOS, ANTIDEPRESSIVOS, CALMANTEs, ANTIPSICÓTICOS, BRONCODILATADORES)

CASO O HORÁRIO DE TOMAR A MEDICAÇÃO ESTEJA DENTRO DO PERÍODO DE JEJUM
TOMAR COM ÁGUA (20mL) - EQUIVALENTE A MEIO COPINHO DESCARTÁVEL USADO PARA SERVIR CAFÉ

CLASSES DE MEDICAÇÕES QUE DEVEM SER INTERROMPIDAS.

ANTICOAGULANTES
ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS
HIPOGLICEMIANTEs.

**TODA MEDICAÇÃO SÓ DEVERÁ SER INTERROMPIDA/SUSPENSA
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO(A) MÉDICO(A) RESPONSÁVEL.**

PRAZO DE SUSPENSÃO (APENAS PARA INFORMAÇÃO) DOS MEDICAMENTOS

14 (CATORZE) DIAS ANTES DO DIA DO EXAME

DULAGLUTIDA
SEMAGLUTIDA

07 (SETE) DIAS ANTES DO DIA DO EXAME

PRASUGREL
CLOPIDOGREL
TICAGRELOR

05 (CINCO) DIAS ANTES DO DIA DO EXAME

VARFARINA
FEMPROCUMONA

02 (DOIS) DIAS ANTES DO DIA DO EXAME

LIRAGLUTIDA
DAPAGLIFLOZINA
EMPAGLIFLOZINA

01 (UM) DIA ANTES DO DIA DO EXAME

APIXABANA
RIVAROXABANA
DABIGATRANA
EDOXABANA
ABCIXIMAB
FONDAPARINUX
DIPIRIDAMOL
CILOSTAZOL

12 (DOZE) HORAS ANTES DO DIA DO EXAME

ENOXAPARINA
NADROPARINA

OBSERVAÇÕES

- NO CASO DA IMPOSSIBILIDADE OU DA NÃO AUTORIZAÇÃO DA SUSPENSÃO DO MEDICAMENTO O EXAME ENDOSCÓPICO PODERÁ SER REALIZADO, COM A SEGUINTE RESSALVA:
PROCEDIMENTOS COMO BIÓPSIAS E REMOÇÃO DE PÓLIPOS NÃO SERÃO FEITOS PELO ALTO RISCO DE HEMORRAGIA

- O PESO MÁXIMO PERMITIDO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME É DE 150 KG.

- É OBRIGATÓRIA A PRESENÇA DE UM ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL.